



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## BOLETIM DE NOTIFICAÇÃO DE FOCO DE TUBERCULOSE – 003/2022

<b>Município</b>	ITACOATIARA/AM
<b>Agente etiológico</b>	Mycobacterium bovis
<b>Data da Confirmação do Evento</b>	29/01/2022
<b>Tipo de Diagnóstico</b>	Teste tuberculínico intradérmico (PPD - purified protein derivative)

### Foco 01

<b>Ocorrência</b>	S13019020006 ITACOATIARA/ AM					
<b>Data de início da investigação</b>	02/02/2022 – 10:23H					
<b>Status do Foco</b>	Encerrada					
<b>Unidade Epidemiológica</b>	Propriedade Rural					
<b>Animais afetados</b>	<b>Espécie</b>	<b>Susceptíveis</b>	<b>Casos</b>	<b>Mortos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Abatidos</b>
	BUBALINOS	272	8	0	8	0
<b>Investigação Clínica e Epidemiológica</b>						
<b>Origem do Foco</b>	Na inspeção clínica do rebanho avaliado foi observado emagrecimento progressivo de algumas fêmeas. A via de transmissão pode ser: <b>Direta:</b> Via aérea e oral, através de aerossóis (mais importante). <b>Indireta:</b> Leite, água, alimentos e fômites contaminados. <b>Período de Incubação:</b> Os sinais clínicos da tuberculose geralmente levam meses para se desenvolver. <b>Observação:</b> É uma zoonose. O grande risco para a saúde pública decorre da ingestão de leite cru ou de produtos lácteos não submetidos a tratamento térmico oriundos de animais infectados.					
<b>Comentários</b>	Afeta Mamíferos domésticos (bovinos são os hospedeiros verdadeiros) e algumas espécies silvestres. A tuberculose é uma doença crônica debilitante em bovinos e bubalinos, normalmente assintomática em sua fase inicial. A detecção de casos clínicos não é muito comum, havendo predomínio de manifestações pouco específicas. Sinais clínicos: fraqueza, perda de apetite e peso, febre flutuante, dispnéia e tosse intermitente, sinais de pneumonia de baixo grau, diarreia, linfonodos aumentados e, em alguns casos, supurados. Lesões compatíveis: lesões post-mortem como granuloma (caseoso ou calcificado) nos linfonodos da cabeça e					



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

tórax, no pulmão, fígado, baço e nas superfícies (serosas) das cavidades do corpo.

## Tratamento, prevenção e controle transmitidos nos atendimentos

### Comentários

Os casos confirmados devem ser devidamente identificados com marcação específica na face, isolados, retirados da produção leiteira e, em no máximo 30 dias do diagnóstico, ser submetidos à eutanásia na propriedade ou abate em estabelecimento de inspeção,  
Exigência de resultados negativos de tuberculose para trânsito de animais





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Localização do Evento

